

開け口

第3類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ

2.服用後、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管してください。

2.小児の手の届かない所に保管してください。

3.他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。

4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

5.開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。

6.カプセルを冷蔵庫に保管しますと庫外に出した時、水分が付着しますのでさけてください。また、カプセルを濡れた手で取り扱わないでください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社

お客様相談室 電話(0568)42-1234

受付時間 9:00~12:00, 14:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

使用期限

60mL×4

(日本薬局方カプセル60個×4)

製造番号

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

オキソピンLは、国産ニンニクより抽出したニンニクエキスに、人参、ビタミンB1、B6を配合した滋養強壮保健剤です。

〔成分・分量〕1日量(2mL)中

ニンニクエキス……………1,000mg(ニンニクとして3,000mg)
ニンジンエキス……………54mg(人参として600mg)

チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩)……………20mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)……………25mg

添加物としてD-ソルビトール、希塩酸、安息香酸Na、パラベン、カラメル、シクロデキストリン、エタノール、香料を含有します。添付のカプセルにゼラチンを含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤には生薬成分が配合されていますので、多少色調の異なること、もしくはまれに沈殿を生じることがあります。効果に変わりはありません。よく振ってから服用してください。

〔効能・効果〕


●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給●滋養強壮●虚弱体质

〔用法・用量〕成人(15歳以上)


1回1mLを添付のカプセルに入れ、1日2回服用してください。

〔用法・用量に関連する注意〕


(1)カプセル1個に1mLの薬液が入ります。



カプセルをはずします



カプセルに薬液を入れます



カプセルをしっかりとはめて
服用してください

(2)のどを詰まらせるおそれがありますので、カプセルを服用するときは、必ず起き上がった状態で、十分な水又はぬるま湯でかままずに服用してください。

(3)カプセルには服用直前に薬液を入れてください。